

Документ подписан простой электронной подписью  
 Информация о владельце:  
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович  
 Должность: ректор  
 Дата подписания: 11.06.2014 08:04:06  
 Уникальный программный ключ:  
 e7a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6b6dcf836

**Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:**

**Поликлиническая неотложная педиатрия, СЕМЕСТР 12**

Код, направление подготовки	31.05.02 Педиатрия
Направленность (профиль)	Педиатрия
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Детских болезней
Выпускающая кафедра	Детских болезней

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
ОПК-6 ПК-2	<b>Укажите один правильный ответ</b> 1. К какой группе здоровья относится ребенок из неблагополучной семьи (алкоголизм родителей, неполная семья и др.)?	а) 1 группа здоровья б) 2 группа здоровья в) 3 группа здоровья г) 4 группа здоровья д) 5 группа здоровья.	низкий
ОПК-6 ПК-2	<b>Укажите один правильный ответ</b> 2. Назовите срок первичной вакцинации АКДС и против полиомиелита недоношенного ребенка, родившегося массой до 1500 г.	а) 3 мес б) 6 мес. в) 9 мес. г) 12 мес. д) после 1 года	низкий
ПК-6 ПК-9 ПК-10	<b>Укажите один правильный ответ</b> 3. Длительность основного курса – I этапа, купирующей ферротерапии пероральными препаратами железа в среднем составляет: а) 3-4 недели б) 6-10 недель в) 12-24 недели	а) 3-4 недели б) 4 – 8 нед в) 6-10 недель г) 12-24 недели	низкий
ПК-6 ПК-9 ПК-10 ПК-11	<b>Укажите один правильный ответ</b> 4. Продолжительность периода определения толерантности к пище при гипотрофии II степени составляет	а) 1-2 дня б) 3-7 дней в) 10 дней г) до 14 дней	низкий
ПК-6 ПК-9 ПК-10	<b>Укажите один правильный ответ</b> 5. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ	1) Klebsiella 2) Serratia 3) Pseudomonas spp 4) Escherichia coli	низкий

	ЯЛЯЕТСЯ	5) Staphylococcus saprophyticus	
ПК-6 ПК-9 ПК-10	<b>Укажите все правильные ответы</b> 6. Критериями изучения и оценки НПП новорожденного ребенка являются:	а) навыки б) анализаторы зрительный, слуховой в) рефлекс, мышечный тонус г) эмоции д) практические действия	средний
ПК-6 ПК-9 ПК-10 ПК-11	<b>Укажите все правильные ответы</b> 7. При спазмофилии после оказания неотложной помощи в терапии используют:	а) препараты кальция внутрь б) хлористый аммоний 10% раствор, 1 ч.л. 3 раза в день в) витамин D 4000 ME ежедневно с 4-5 дня г) оксидутират натрия 50-100 мг/кг д) витаминотерапию	средний
ОПК-6 ПК-2	<b>Укажите все правильные ответы</b> 8. Какие из нижеперечисленных вакцин являются живыми	а) АКДС б) БЦЖ в) коревая г) ОПВ	средний
ОПК-6 ПК-2	<b>Укажите все правильные ответы</b> 9. Укажите декретированные сроки вакцинации и ревакцинации против кори	а) 6 мес. б) 12 мес. в) 18 мес. г) 3 года д) 6 лет	средний
ПК-6 ПК-9 ПК-10 ПК-11	<b>Укажите все правильные ответы</b> 10. Какой кашель характерен для острого обструктивного ларинготрахеита?	а) сухой б) влажный в) приступообразный г) лающий д) надсадный е) больше утром ж) в течение дня з) ночной и) болезненный	средний
ПК-6 ПК-9 ПК-10 ПК-11	<b>Укажите все правильные ответы</b> 11. Назовите заболевания, для которых характерна инспираторная одышка?	а) острый бронхит б) острая пневмония в) инородное тело бронха г) обструктивный ларинготрахеит д) приступ бронхиальной астмы е) заглочный абсцесс	средний
ПК-6 ПК-9 ПК-10	<b>Укажите все правильные ответы</b> 12. 5. Основные симптомы скарлатины:	а) тонзиллит б) «малиновый» язык в) мелкоочечная сыпь на гиперемизованном фоне г) крупно-точечная сыпь на	средний

		обычном фоне д) энантема е) бледный носогубный треугольник	
ПК-6 ПК-9 ПК-10 ПК-11	<b>Укажите все правильные ответы</b> 13. Для II стадии (декомпенсации) астматического состояния характерны	а) учащенное шумное дыхание б) потеря сознания в) большое количество сухих и влажных хрипов г) отсутствие дыхательных шумов в отдельных сегментах д) понижение артериального давления е) острая сердечная недостаточность ж) диффузный цианоз кожи и слизистых з) страх удушья	средний
ПК-6 ПК-9 ПК-10	<b>Укажите все правильные ответы</b> 14. Какие параклинические методы используют для диагностики хронического гастродуоденита:	а) рентгенография желудка б) УЗИ печени в) фракционное дуоденальное зондирование г) фракционное исследование желудочного сока д) рентгенологическое исследование в условиях искусственной гипотонии е) гастродуоденофибро- скопия	средний
ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-9	<b>Укажите все правильные ответы</b> 15. Характерными клиническими признаками первичной лактазной недостаточности являются	а) частый стул б) стеаторея в) пенистый стул г) водянистый стул д) кислый запах стула е) метеоризм ж) зловонный стул з) боли в животе после приема молока	средний
ПК-6 ПК-9 ПК-10	<b>Укажите все правильные ответы</b> 16. Для лечения геморрагического васкулита используются препараты (выберите 4 из них)	а) антигистаминные б) дицинон в) преднизолон г) эpsilon- аминокапроновая кислота д) антиагреганты е) гепарин ж) факторы свертывания крови	высокий
ОПК-9 ОПК-10	<b>Укажите все правильные ответы</b> 17. Распределите отделы дыхательного тракта	1. верхние (А,Г) 2. средние (Б,Е,Ж) 3. нижние (В,Д) А. нос Б. гортань	высокий

		В. бронхиолы Г. глотка Д. альвеолы Е. трахея Ж. долевыe и сегментарные бронхи	
ПК-6 ПК-9 ПК-10	<b>Закончите предложение</b> 18. Проведение во время профилактического медицинского осмотра детей: лабораторной диагностики, антропометрии, плантографии, измерения АД относится к -		высокий
ПК-6 ПК-9 ПК-10	<b>Закончите предложение</b> 19. Суставной синдром при острой ревматической лихорадке характеризуется		высокий
ПК-6 ПК-9 ПК-10 ПК-11	<b>Выберите правильную комбинацию ответов</b> 20. Укажите, медиаторами аллергии какого типа являются следующие бав:	1. Гистамин 2. Фактор, угнетающий миграцию макрофагов 3. Гепарин 4. Хемотаксический фактор для макрофага 5. Фактор, активирующий макрофаги (ФАМ)	высокий